

OUTILS POUR LA MESURE DES INDICATEURS D'ALERTE ET DE MAITRISE

CONTRIBUTEURS

Plateforme professionnelle HAS « Prescription, prévention de la iatrogénie, sujet âgé »

Groupe de travail

Nadia COHEN, médecin coordonnateur,
établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes, Jardins d'Alésia, Groupe
Korian, Paris

Rémy COLLOMP, pharmacien hospitalier, CHU
Nice

Bruno DELMARRE, gériatre, Fédération des
réseaux gérontologiques PACA, Marseille

Edith DUFAY, pharmacien hospitalier, CH de
Luneville

Stéphanie FAURE, gériatre, CH du Pays du Gier,
Saint Chamont

Xavier GERVAIS, médecin coordonnateur,
secrétaire général de la FFAMCO, Bordeaux
Corinne MOMPLOT, médecin coordonnateur, CH
du Pays du Gier, Saint Chamont

Yves PASSADORI, gériatre, CH de Mulhouse

Catherine PIERRE, médecin généraliste, médecin
coordonnateur, Hôpital Bretonneau, Paris

François PUISIEUX, gériatre, CHU de Lille

Mounir RHALIMI, pharmacien hospitalier, CH
Bertinot Juel, Chaumont en Vexin

Haute Autorité de Santé – Direction de l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins - Service Programmes Pilotes Impact Clinique (SPPIC)

Armelle LEPERRE DESPLANQUES, chef de service SPPIC, Nathalie RIOLACCI, adjoint chef de service
Carole MICHENEAU, chef de projet

© Haute Autorité de Santé - Janvier 2012

PROGRAMME AMI ALZHEIMER

Alerte et Maîtrise de la Iatrogénie des neuroleptiques (NL) dans la maladie d'Alzheimer

LISTE DES NEUROLEPTIQUES/ANTIPSYCHOTIQUES POUR LA MESURE DE L'ALERTE (mise à jour décembre 2011)

Spécialité commerciale	DCI	ATC	Spécialité commerciale	DCI	ATC	Spécialité commerciale	DCI	ATC
Phénothiazines			Haldol®, Génériques	halopéridol	N05AD01	Thioxanthènes		
Largactil®	chlorpromazine	N05AA01	Semap®	penfluridol	N05AG03	Clopixol®	zuclopenthixol	N05AF05
Melleril®	thioridazine	N05AC02	Benzamides			Fluanxol®	flupentixol	N05AF01
Moditen®, Modecate®	fluphénazine	N05AB02	Solian®, Génériques	amisulpride	N05AL05	Autres antipsychotiques		
Neuleptil®	périciazine, propériciazine	N05AC01	Dogmatil®, Synedil®, Aiglonyl®, Génériques	sulpiride	N05AL01	Zyprexa®, Arkolamyl®, Bloonis®, Olanpha®, Orolanpha®, Orozapinol®, Zapinol®, Zolactac®, Zypadhara®, Génériques	olanzapine	N05AH3
Nozinan®	lévomépromazine	N05AA02	Barnetil®, Génériques	sultopride	N05AL02	Abilify®	aripiprazole	N05AX12
Piportil®	pipotiazine	N05AC04	Tiapridal®, Equilium®, Génériques	tiapride	N05AL03	Risperdal®, Belivon®, Risetar®, Génériques	risperidone	N05AX08
Tercian®	cyamémazine	N05AA06	Diazépines et oxazépines			Orap®	pimozide	N05AG02
Trilifan retard®	perphénazine	N05AB03	Leponex®, Génériques	clozapine	N05AH2	Zeldox®	ziprasidone	N05AE04
Butyrophénones			Loxapac®	loxapine	N05AH1	Prazinil®	carpipramine	Z
Dipiperon®	pipampérone	N05AD05	Xeroquel®, Génériques	quetiapine	N05AH4	Xenazine®, Tetmodis®	tetrabenazine	N05AK01
Drolpetan®	dropéridol	N05AD08						

Thioridazine: AMM abrogées - Haldol (halopéridol) 1 mg, Perphénazine, penfluridol : arrêt de la commercialisation - Ziprasidone ATU 2007 Tetrabenazine, ATU 2007

EXEMPLE DE TABLEAU DE RECUEIL POUR LA MESURE DE LA MAITRISE

PATIENT	DIAGNOSTIC ET/OU SYMPTOMES	NEUROLEPTIQUES	DATE INITIALISATION TRAITEMENT	REVISION PRESCRIPTION DANS LES 3 MOIS	ARRET NEUROLEPTIQUES SUITE A LA REVISION DE LA PRESCRIPTION	OPTIMISATION DU DIAGNOSTIC	CONFIRMATION PRESCRIPTION
	<input type="checkbox"/> Psychose <input type="checkbox"/> Confusion aigue <input type="checkbox"/> Hallucination <input type="checkbox"/> Délire <input type="checkbox"/> Agitation <input type="checkbox"/> Agressivité <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI, suite diagnostic expert <input type="checkbox"/> OUI, suite intervention équipe mobile <input type="checkbox"/> OUI, suite concertation pluridisciplinaire <input type="checkbox"/> OUI, sans autre évaluation ou autre avis nécessaire